

Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Målgruppe	Afdelinger som behandler patienter med knoglemetastaser Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker	
Udarbejdet af	RADS fagudvalg for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer	
Behandlingsvejledning godkendt af RADS	24. januar 2013	
Lægemiddelrekommandation godkendt af fagudvalget	1. juli 2013	
Lægemiddelrekommandation er gældende fra kontraktstart	1. oktober 2013	Version: 1.0 Dokument nr.: 126909 Dato: 1. juli 2013

Rekommandationen er udarbejdet på basis af baggrundsnotatet med referencer, behandlingsvejledning samt sammenligningsgrundlag, som kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, www.regioner.dk. Lægemidlerne er pr. administrationsform anført i prioriterede rækkefølge ud fra den opnåede lægemiddelpris (Amgros tilbudspris) jvf. sammenligningsgrundlag.

Brystkræft

Administrationsform	p.o.	i.v. (15 min)	i.v. (90 min)	S.C.
Pt. i peroral antineoplastisk behandling	1. Bondronat 2. clodronsyre	1. Zoledronsyre Hospira 2. Bondronat	Pamidronatdinatrium "Hospira"	Xgeva
Pt. i parenteral antineoplastisk behandling Pt. med dyspeptiske gener Pt. som ikke kan faste	-	1. Zoledronsyre Hospira 2. Bondronat	Pamidronatdinatrium "Hospira"	Xgeva

Prostata og lungekræft

Administrationsform	i.v.	S.C.
Pt. i peroral antineoplastisk behandling	Zoledronsyre Hospira	Xgeva
Pt. i parenteral antineoplastisk behandling Pt. med dyspeptiske gener Pt. som ikke kan faste	Zoledronsyre Hospira	Xgeva

Ændringslog:

Version:	Dato:	Ændring:
1.0		