

Lægemiddelrekommandation vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Målgruppe	Afdelinger som behandler patienter med metastaserende nyrekræft Lægemiddelkomiteer Sygehusapoteker	
Udarbejdet af	Fagudvalget vedr. medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin	
Behandlingsvejledning godkendt af RADS	25. april 2013	
Lægemiddelrekommandation godkendt af fagudvalget	12. august 2013	
Lægemiddelrekommandation gældende fra	01.januar 2014	Version: 1.0 Dokument nr.: 130670 Dato: 12.08.2013

Ved hver ordination skal lægemiddelvalget vurderes i den angivne prioriterede rækkefølge.

1.linje				
Targetteret behandling af patienter med clear cell mRCC i god og intermediær prognosegruppe jf. MSKCC:				
Prioriteret rækkefølge	Lægemiddel	Dosering	Bemærkning	Andel af patienter (%)
1	Votrient (GSK)	800 mg x 1 dagligt	<i>Afvigelse fra 1. valg på baggrund af individuel vurdering af komorbiditet, jf. gældende SPC</i>	75%
2	Sutent (Pfizer)	50 mg dagligt i 4 uger efterfulgt af 2 ugers pause		25%

1.linje				
Targetteret behandling hos patienter med mRCC i dårlig prognosegruppe jf. MSKCC eller non-clear cell:				
Prioriteret rækkefølge	Lægemiddel	Dosering	Bemærkning	Andel af patienter (%)
1	Torisel (Pfizer)	25 mg intravenøst ugentligt	<i>Afvigelse fra 1. valg på baggrund af individuel vurdering af komorbiditet, jf. gældende SPC</i>	60%
2	Sutent (Pfizer)	50 mg dagligt i 4 uger efterfulgt af 2 uger pause		40%

2.linje				
Targetteret behandling hos pt. med clear cell mRCC og progression efter 1. linje immunterapi:				
Prioriteret rækkefølge	Lægemiddel	Dosering	Bemærkning	Andel af patienter (%)
1	Inlyta (Pfizer)	5 mg x 2 med mulig dosiseskalation til 10 mg x 2 dagligt	<i>Afvigelse fra 1. valg på baggrund af individuel vurdering af komorbiditet, jf. gældende SPC</i>	Samlet 50%
2	Votrient (GSK)	800 mg x 1 dagligt		
3	Nexavar (Orifarm)	400 mg x 2 dagligt		

2.linje				
Targetteret behandling hos patienter med mRCC og progression efter 1. linje TKI:				
Prioriteret rækkefølge	Lægemiddel	Dosering	Bemærkning	Andel af patienter (%)
1	Afinitor (Novartis)	10 mg x 1 dagligt (forsigtighed ved komorbiditet)	<i>Afvigelse fra 1. valg på baggrund af individuel vurdering af komorbiditet, jf. gældende SPC</i>	Samlet 50%
2	Inlyta (Pfizer)	5 mg x 2 dagligt med mulig dosiseskalation til 10 mg x 2 dagligt		

Ændringslog:

Version:	Dato:	Ændringer:
1.0	August 2013	