

## Sammenligningsgrundlag for lægemiddelrekommandation vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft i 2. linje efter 1.linje behandling med targetteret behandling

<b>Målgruppe</b>	Afdelinger som behandler patienter med metastaserende nyrekræft Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker	
<b>Udarbejdet af</b>	Fagudvalget vedr. medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin	
<b>Godkendt af RADS</b>	25. april 2013	Dok. nr.: 122029 Dato: 20130515 Version: 1.1

Sammenligningsgrundlaget er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, behandlingsvejledning samt dette sammenligningsgrundlag kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, [www.regioner.dk](http://www.regioner.dk).

### Formål

Formålet med dette sammenligningsgrundlag er at sikre korrekt fastlæggelse af ækvi-effektive behandlinger i henhold til den godkendte RADS-behandlingsvejledning for terapiområdet.

### Metastaserende nyrekræft 2. linje efter 1.linje targetteret behandling

Omkring 1/3 del af de patienter, der årligt modtager systemisk behandling, for metastatisk sygdom forventes af være kandidater til yderligere systemisk behandling efter progression på 1.linje behandling. Af disse vurderes godt 50% at kunne modtage enten axitinib eller everolimus ved progression på 1. linje targetteret behandling.

### Doseringstabel

Sammenligningsgrundlaget vurderes på baggrund af 5 måneders behandling, da den mediane progressionsfri overlevelse efter 1. linje behandling med targetteret behandling er på henholdsvis 4,8 måneder for axitinib og 4,9 måneder for everolimus. Med hensyn til vedligeholdelsesbehandling er der tale om gennemsnitsbetragtning, velvidende at der kan være behov for henholdsvis dosiseskalation eller dosisreduktion for de enkelte lægemidler.

Lægemiddel	Administrationsform	Vanlig vedligeholdelsesbehandling
axitinib	p.o.	5 mg x 2 dagligt
everolimus	p.o.	10 mg x 1 dagligt

Ved rekommandation anføres de anførte lægemidler pr administrationsform i prioriteret rækkefølge ud fra den opnåede lægemiddelpris jf. sammenligningsgrundlag.

<b>Version</b>	<b>Dato</b>	<b>Ændring</b>
1.1	Maj 2013	Administrationsform på everolimus