

Sammenligningsgrundlag for Lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse som sekundær profylakse ved apopleksi

Målgruppe	Neurologiske og medicinske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker
Udarbejdet på baggrund af	Baggrundsnotat og Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse som sekundær profylakse ved apopleksi
Baggrundsnotat og behandlingsvejledning godkendt af RADS	8. maj 2012

Sammenligningsgrundlaget er udarbejdet på basis af Baggrundsnotatet for terapiområdet. Baggrundsnotatet med referencer, behandlingsvejledning samt dette sammenligningsgrundlag kan downloades fra Danske Regioners hjemmeside, www.regioner.dk.

Formål

Formålet med dette sammenligningsgrundlag er at sikre korrekt fastlæggelse af ækvivalente behandlinger i henhold til den godkendte behandlingsvejledning for terapiområdet.

Baggrundsnotatet omfatter nye patienter og patienter der grundet manglende respons skal skifte behandling.

Doseringstabel (Acetylsalicylsyre = ASA)

Præparat	Initial behandling	Efterfølgende daglig dosering	Varighed
Clopidogrel	75 mg x 1 + ASA 75 mg x 1 i 5 dage	75 mg	Livslang
Clopidogrel stød dosis regime	300 mg x 1 + evt. 300 mg ASA x 1	75 mg	Livslang
Dipyridamol retard	200 mg x 2 + ASA 75 mg x 1	200 mg x 2 + ASA 75 mg x 1	Livslang
Dipyridamol retard kombinationslgm.	200 mg og ASA 25 mg x 2	200 mg og ASA 25 mg x 2	Livslang

Estimeret patientantal

Apopleksi	Heraf patienter med behov for støddosis clopidogrel (300 mg initialt), har behov for kun 1 daglig dosering eller oplever hovedpine ved dipyridamol.	Heraf apopleksi hos patienter med forventet behov for kirurgi (dipyridamol).	Heraf patienter som med lige godt resultat kan anvende clopidogrel eller dipyridamol.
13.000	2.000	750	10.250

1. linje uprioriteret	Clopidogrel regime Er særligt velegnet ved samtidig perifer vaskulær sygdom eller iskæmisk hjertesygdom. Velegnet til patienter for hvem kun 1 daglig dosering er en fordel.	Dipyridamol retard + acetylsalicylsyre (Enkeltstoffer eller kombination) Er særligt velegnet til patienter med forventet behov for kirurgi. Patienter med intolerabel hovedpine som ikke svinder anbefales clopidogrel.
2. linje	Ved manglende tolerance for clopidogrel anvendes Dipyridamol retard + acetylsalicylsyre	Ved manglende tolerance for dipyridamol retard + acetylsalicylsyre anvendes Clopidogrel regime

Sammenligningsgrundlag for 6 dages behandling på hospital

Regime	Sammenligningsvolumen	
	Lægemiddel	Antal tabletter
Clopidogrel	Clopidogrel Acetylsalicylsyre	75 mg, 6 tabletter + 75 mg, 5 tabletter
Clopidogrel stød dosis	Clopidogrel Clopidogrel Acetylsalicylsyre	300 mg, 1 tablet + 75 mg, 5 tabletter + 75 mg, 4 tablet
	Clopidogrel Acetylsalicylsyre	75 mg, 9 tabletter + 75 mg, 4 tabletter
Dipyridamol	Dipyridamol retard Acetylsalicylsyre	200 mg, 12 tabletter + 75 mg, 6 tabletter
	Dipyridamol retard + Acetylsalicylsyre, kombinationspræparat	200 mg + ASA 25 mg, 12 tabletter

I sammenligningsgrundlaget er medtaget den nødvendige samtidige medicinering med acetylsalicylsyre. Den på rekommandationstidspunktet gældende tilbudspris for tillægslægemidlet, ASA, vil blive tillagt prisen på hovedlægemidlet (clopidogrel og dipyridamol retard).