

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

| | | |
|---|---|--|
| Målgruppe | Regionale dermatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker | |
| Udformet på baggrund af | Baggrundsnotat og behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser | |
| Behandlingsvejledning godkendt af RADS | 20. juni 2013 | Version: 2.6 Dokument nr.: 157423 Dato: April 2016 |
| Lægemiddelrekommandation er gældende fra | 1. maj 2016 til 30. juni 2016 | |

Lægemiddelrekommandation er udarbejdet på baggrund af de rammekontrakter, sygehusapotekerne køber ind under.

%-angivelse viser efterlevelse for 1. linje og efterfølgende linjer.

| Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis uden ledaffektion for nye patienter og patienter der skal skifte behandling | | | |
|---|-----------------------------|---|----|
| Linje | Lægemiddel | Dosering | % |
| 1 | Stelara, ustekinumab | <u>Subkutan regime:</u> Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. | 80 |
| 2 | Humira, adalimumab | <u>Subkutan regime:</u> 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. uge | |
| 3 | Remsima, infliximab | <u>Intravenøst regime:</u> 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge | |
| 4 | Benepali, etanercept | Subkutan 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt | |

| Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis med psoriasisartropati for nye patienter og patienter der skal skifte behandling | | | |
|--|-----------------------------|---|----|
| Patienter for hvem ledpåvirkning er det dominerende symptom, behandles efter reumatologisk behandlingsvejledning. | | | |
| Linje | Lægemiddel | Dosering | % |
| 1 | Humira, adalimumab | <u>Subkutan regime:</u> 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. uge | 80 |
| 2 | Benepali, etanercept | <u>Subkutan regime:</u> 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt | |
| 3 | Remsima, infliximab | <u>Intravenøst regime:</u> 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge | |
| 4 | Stelara, Ustekinumab | <u>Subkutan regime:</u> Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. | |

| Version: | Dato: | Ændring: |
|-----------------|--------------|--|
| 1.0 | Oktober 2012 | |
| 2.0 | Januar 2013 | Efter udbud efter 2. vurdering Stelara medtaget i lægemiddelrekommandationen, som ligestillet med Humira i 1. linje til pt. u. ledaffektion. |
| 2.1 | Maj 2014 | Rækkefølge af ligestillede lægemidler er ændret som en konsekvens af nye priser pr 2014.07.01 (Stelara og Humira til pt u. ledaffektion) |
| 2.2 | Marts 2015 | Remsima indtræder i stedet for Remicade som en konsekvens af Amgros udbud. |
| 2.3 | April 2015 | Ny rækkefølge som en konsekvens af Amgros udbud |
| 2.4 | | Revision |
| 2.5 | April 2015 | Rækkefølge præciseret |
| 2.6 | April 2016 | Gældende fra 2016.05.01 - 2016.06.30. Enbrel, etanercept er erstattet af Benepali, etanercept, som en konsekvens af udbud. |

Historisk