

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Målgruppe	Regionale dermatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker	
Udformet på baggrund af	Baggrundsnotat og behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser	
Baggrundsnotat godkendt af RADS	27. september 2016	Version: 3.2 Dokument nr.: 237883 Dato: 2016.10
Lægemiddelrekommandation er gældende fra	Oktober 2016	

Lægemiddelrekommandation er udarbejdet med henvisning til baggrundsnotatet og på baggrund af de rammekontrakter, sygehus-apotekerne køber ind under.

%-angivelse viser efterlevelse for 1. og 2. linje.

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis uden ledaffektion for nye patienter og patienter der skal skifte behandling			
Linje	Lægemiddel	Dosering	%
1	Stelara, ustekinumab	Subkutan Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge.	80
2	Cosentyx, secukinumab	Subkutan 2 x 150 mg uge 0, 1, 2, 3 og 4, herefter 2 x 150 mg månedligt	80
3	Humira, adalimumab	Subkutan 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. Uge	
4	Taltz, ixekizumab	Subkutan 2 x 80 mg uge 0, 1 x 80 mg uge 2, 4, 6, 8, 10, 12, herefter 80 mg hver 4. uge	
5	Remsima, infliximab	Intravenøst 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge	
6	Benepali, etanercept	Subkutan 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt	

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis med psoriasisartropati for nye patienter og patienter der skal skifte behandling			
Patienter for hvem ledpåvirkning er det dominerende symptom, behandles efter reumatologisk behandlingsvejledning.			
Linje	Lægemiddel	Dosering	%
1	Cosentyx, secukinumab	Subkutan 2 x 150 mg uge 0, 1, 2, 3 og 4, herefter 2 x 150 mg månedligt	80
2	Humira, adalimumab	Subkutan 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. uge	80
3	Stelara, ustekinumab	Subkutan Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge.	
4	Remsima, infliximab	Intravenøst 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge	
5	Benepali, etanercept	Subkutan 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt	

Version:	Dato:	Ændring:
1.0	2012.10	
2.0	2013.01	Efter udbud efter 2. vurdering Stelara medtaget i lægemiddelrekommandationen, som ligestillet med Humira i 1. linje til pt. u. ledaffektion.
2.1	2014.05	Rækkefølge af ligestillede lægemidler er ændret som en konsekvens af nye priser pr 2014.07.01 (Stelara og Humira til pt u. ledaffektion)
2.2	2015.03	Remsima indtræder i stedet for Remicade som en konsekvens af Amgros udbud.
2.3	2015.04	Ny rækkefølge som en konsekvens af Amgros udbud
2.4		Revision
2.5	2015.04	Rækkefølge præciseret
2.6	2016.04	Gældende fra 2016.05.01 – 2016.06.30. Enbrel, etanercept er erstattet af Benepali, etanercept, som en konsekvens af udbud.
2.7	2016.04	Gældende fra 2016.07.01. Ny rækkefølge som en konsekvens af Amgros udbud
3.0	2016.05	Cosentyx indsat som en konsekvens af vurdering 3.0
3.1	2016.05	Lægemiddelrækkefølgen præciseret. Gældende fra 2016.07.01
3.2	2016.10	Lægemiddelrekommandationen opdateret med ixekizumab for PSO.