

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Målgruppe	Regionale dermatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker	
Udformet på baggrund af	Baggrundsnotat og behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser	
Baggrundsnotat godkendt af RADS	4. maj 2016	Version: 3.1 Dokument nr.: 237883 Dato: Maj 2016
Lægemiddelrekommandation er gældende fra	1. juli 2016	

Lægemiddelrekommandation er udarbejdet på baggrund af de rammekontrakter, sygehusapotekerne køber ind under.

%-angivelse viser efterlevelse for 1. linje.

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis uden ledaffektion for nye patienter og patienter der skal skifte behandling			
Linje	Lægemiddel	Dosering	%
1	Stelara, ustekinumab	Subkutant Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge.	80
2	Cosentyx, secukinumab	Subkutant 2 x 150 mg uge 0, 1, 2, 3 og 4, herefter 2 x 150 mg månedligt	
3	Humira, adalimumab	Subkutant 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. Uge	
4	Remsima, infliximab	Intravenøst 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge	
5	Benepali, etanercept	Subkutant 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt	

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af psoriasis med psoriasisartropati for nye patienter og patienter der skal skifte behandling			
Patienter for hvem ledpåvirkning er det dominerende symptom, behandles efter reumatologisk behandlingsvejledning.			
Linje	Lægemiddel	Dosering	%
1	Cosentyx, secukinumab	Subkutant 2 x 150 mg uge 0, 1, 2, 3 og 4, herefter 2 x 150 mg månedligt	80
2	Humira, adalimumab	Subkutant 80 mg uge 0, 40 mg uge 1, herefter 40 mg hver 2. uge	
3	Stelara, ustekinumab	Subkutant Patienter ≤ 100 kg: 45 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge. Patienter > 100 kg: 90 mg uge 0 og 4 herefter hver 12 uge.	
4	Remsima, infliximab	Intravenøst 5 mg/kg legemsvægt uge 0, 2, 6 og herefter hver 8. uge	
5	Benepali, etanercept	Subkutant 50 mg 2 x ugentligt i 12 uger, herefter 50 mg 1 x ugentligt	

Version:	Dato:	Ændring:
1.0	Oktober 2012	
2.0	Januar 2013	Efter udbud efter 2. vurdering Stelara medtaget i lægemiddelrekommandationen, som ligestillet med Humira i 1. linje til pt. u. ledaffektion.
2.1	Maj 2014	Rækkefølge af ligestillede lægemidler er ændret som en konsekvens af nye priser pr 2014.07.01 (Stelara og Humira til pt u. ledaffektion)
2.2	Marts 2015	Remsima indtræder i stedet for Remicade som en konsekvens af Amgros udbud.
2.3	April 2015	Ny rækkefølge som en konsekvens af Amgros udbud
2.4		Revision
2.5	April 2015	Rækkefølge præciseret
2.6	April 2016	Gældende fra 2016.05.01 - 2016.06.30. Enbrel, etanercept er erstattet af Benepali, etanercept, som en konsekvens af udbud.
2.7	April 2016	Gældende fra 2016.07.01. Ny rækkefølge som en konsekvens af Amgros udbud
3.0	Maj 2016	Cosentyx indsat som en konsekvens af vurdering 3.0
3.1	Maj 2016	Lægemiddelrækkefølgen præciseret. Gældende fra 2016.07.01, og indtræder i stedet for version 2.7