

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger.

Målgruppe	Gastroenterologiske og pædiatriske afdelinger som behandler patienter med kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker	
Udarbejdet af	RADS Fagudvalg for dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme	
Baggrundsnataret godkendt af RADS	30. november 2016	Version: 3.1 Dok.nr: 273422 Offentligjort: januar 2017

Formål

Formålet med RADS behandlingsvejledninger er at sikre national konsensus om behandling med lægemidler; herunder at definere hvilke lægemidler, der anses for ligestillede. Formålet med RADS baggrundsnotater er at fremlægge beslutningsgrundlaget for behandlingsvejledningen.

Konklusion vedr. lægemidlerne

I rekommendationen for de respektive patientgrupper prioriteres de ligeværdige lægemidler i rækkefølge på baggrund af den opnåede lægemiddelpriis.

Crohn's sygdom hos voksne	Luminal Crohn's sygdom (bionaive og bioerfarne)	Fistulerende Crohn's sygdom (bionaive og bioerfarne)
1. linje, uprioriteret, 80 % efterlevelse	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Adalimumab 	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab Adalimumab
2. linje, uprioriteret, 80 % efterlevelse	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Adalimumab 	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab Adalimumab
3. linje, Uprioriteret	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Adalimumab Ustekinumab 	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Ustekinumab
4. linje, Uprioriteret	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Adalimumab Ustekinumab 	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Ustekinumab

- Ved primær svigt (efter induktionsbehandling) vælges lægemiddel med anden virkningsmekanisme.
- Ved sekundær svigt, hvorved forstås tab af effekt, efter der initialt er opnået god behandlingsrespons, kan lægemiddel med tilsvarende virkningsmekanisme anvendes.

Colitis ulcerosa hos voksne	Kronisk aktiv, moderat til svær colitis ulcerosa (bionaive og bioerfarne)	Akut svær colitis ulcerosa
1. linje, Uprioriteret, 80 % efterlevelse	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Golimumab 	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab
2. linje, Uprioriteret, 80 % efterlevelse	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Golimumab 	
Anvend som 3. linje	<ul style="list-style-type: none"> Vedolizumab Infliximab Golimumab 	
Overvej som 3. linje	<ul style="list-style-type: none"> Adalimumab 	

- Ved primær svigt (efter induktionsbehandling) vælges lægemiddel med anden virkningsmekanisme.
- Ved sekundær svigt, hvorved forstås tab af effekt, efter der initialt er opnået god behandlingsrespons, kan lægemiddel med tilsvarende virkningsmekanisme anvendes.

Børn	Moderat til svær, aktiv Crohn's sygdom hos børn	Moderat til svær, aktiv colitis ulcerosa hos børn
1. linje	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab Adalimumab 	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab
2. linje	<ul style="list-style-type: none"> Infliximab Adalimumab 	

Kriterier for igangsætning af behandling

Luminal Crohn 's sygdom

Biologisk behandling kan initieres ved moderat til svær inflammatorisk aktiv sygdom, som ikke kan bringes i remission på konventionel behandling med systemisk steroid og immunmodulerende behandling (azathioprin 1,5-2,5 mg/kg/døgn, 6-mercaptopurin 0,75-1,5 mg/kg/døgn, methotrexat 25 mg/uge oralt eller subkutan) eller hvis denne behandling ikke tåles.

Fistulerende Crohn 's sygdom

Biologisk behandling kan initieres ved simpel fistel med rektal inflammation eller kompleks fistel, hvor initialbehandling (absces-drænage, setontråd, antibiotika og immunmodulerende behandling: azathioprin 1,5-2,5 mg/kg/døgn, 6-mercaptopurin 0,75-1,5 mg/kg/døgn, methotrexat 25 mg/uge oralt eller subkutan) ikke har tilstrækkelig effekt. Ved kompleks fistel kan biologisk behandling overvejes som den initiale behandling, men efter der er sikkerhed for at abscesser er tilstrækkelig drænerede.

Akut svær colitis ulcerosa

Svært aktiv UC, som kun har partielt respons efter 3-5 hele døgns behandling med højdosis systemisk steroid, kan, hvis kirurgisk behandling ikke foretrækkes, behandles med infliximab.

Kronisk aktiv colitis ulcerosa

Biologisk behandling kan initieres ved kronisk aktiv UC som ikke kan bringes i remission, eller som recidiverer under aftrapning af steroidbehandling, som ikke kan holdes i remission med immunosuppressiv behandling (azathioprin 1,5-2,5 mg/kg/døgn, 6-mercaptopurin 0,75-1,5 mg/kg/døgn), og hvor kirurgi ikke foretrækkes.

Endoskopi/Billeddiagnostik forud for biologisk terapi

Endoskopisk status (ileokoloskopi) og/eller billeddiagnostisk undersøgelse (e.g. MR, CT, UL transabdominal /luminal) anbefales mhp. udbredning og sværhedsgradsgrad af inflammation samt mulige komplikationer (stenose/striktur, fistler, ansamlinger) hos patienterne, som har svigt af konventionel behandling.

Børn

Ved både CD og UC indgår forsinkel vækst og pubertet i indikationsgrundlaget for at begynde behandling med biologiske lægemidler og blandt højrisiko patienter for alvorligt sygdomsforløb kan biologisk terapi initieres på diagnosetidspunktet.

Kriterier for skift af behandling

Generelt forhold vedrørende **skift af biologisk behandling**:

- Hvis en given biologisk behandling ikke opnår effekt i løbet af 3-4 måneder bør ændring i behandling overvejes (dosisændring – kortere behandlingsinterval mellem infusioner/injektioner), skift til anden biologisk terapi eller vurdering mhp. kirurgisk intervention.
- Ved primær svigt (manglende effekt af induktionsbehandling) vælges lægemiddel med anden virkningsmekanisme.
- Ved sekundær svigt, hvorved forstås tab af effekt, efter der initialt er opnået behandlingsrespons, kan lægemiddel med tilsvarende virkningsmekanisme anvendes.

Luminal Crohn's sygdom

Ved remission efter induktionsbehandling revurderes behandlingsbehov med henblik på fortsat vedligeholdelsesbehandling eller ophør med den biologiske behandling.

Ved partiel respons af induktionsbehandling kan det overvejes at fortsætte med vedligeholdelsesterapi. Eventuelt kan intensivering af behandling komme på tale hos patienter i behandling med TNF α -hæmmere (afkortning af interval mellem infusioner/injektioner, øgning af dosis). Hos børn indgår vækst og pubertet i vurdering af behandlingseffekt.

Ved manglende effekt (ingen effekt eller forværring af symptomer), af induktionsbehandling eller vedligeholdelsesbehandlingen, bør behandlingen ophøre eller skift til anden biologisk behandling overvejes.

Fistulerende Crohn's sygdom

Ved komplet primær respons (lukning af fistel eller ophørt sekretion) efter induktionsbehandling revurderes behandlingsbehov, med henblik på fortsat vedligeholdelsesbehandling eller ophør med den biologiske behandling.

Ved partiel respons kan behandling fortsætte, dosisøgning eller kortere behandlingsinterval kan overvejes.

Ved manglende effekt af induktionsbehandling eller den fortsatte vedligeholdelsesbehandling afsluttes behandlingen.

Akut svær colitis ulcerosa

Ved remission efter få døgn fortsættes induktionsbehandlingen, som kan efterfølges af vedligeholdelsesbehandling efter en individuel vurdering. Behandling med 5-aminosalicylsyreholdig (5-ASA)-lægemiddel og immunosupressiva (azathioprin, 6-mercaptopurin) fortsættes eller initieres.

Ved partiel/manglende respons bør patienten anbefales operation.

Kronisk aktiv colitis ulcerosa

Ved komplet respons efter induktionsbehandling revurderes behandlingsbehov, med henblik på fortsat behandling eller ophør med den biologiske behandling.

Ved partiel/manglende respons eller forværring ophører den biologiske behandling og kirurgi tilbydes.

Kriterier for seponering af behandling

Patientspecifikke forhold kan indicere behandling i en længerevarende periode (dette gælder særligt for børn). Generelt har det vist sig at genoptagelse af anti-TNF behandling efter en længere pause ikke er ledsaget af tab af effekt eller øget hyppighed af bivirkninger^{74,75}.

På den baggrund bør der ved længerevarende remission i luminal Crohn's sygdom og UC forsøges at ophøre med biologisk behandling under fortsat monitorering af sygdomsaktiviteten.

Hvor længe der bør være remission før forsøg på ophør er ikke baseret på klinisk kontrollerede studier, men langvarig klinisk/biomarkørsmæssig remission samt eventuelt endoskopisk/billeddiagnostisk (især ved fistulerende Crohn's sygdom) fravær af inflammation, synes at være en forudsætning for at patienten kan være i vedvarende remission uden biologisk terapi.

Luminal Crohn's sygdom

Effekten af vedligeholdelsesbehandling bør vurderes (klinisk/biokemisk) hver 26/52 uge. Ved tegn på sygdomsaktivitet fortsættes behandlingen.

Hvis sygdommen er i remission kan behandlingen ophøre og der genmonitoreres efter 8-12 uger. Ved fortsat inaktiv sygdom fortsætter patienten uden biologisk behandling.

Ved recidiv efter ophør af vedligeholdelsesbehandling kan behandlingen genoptages.

Fistulerende Crohn's sygdom

Patienter med kompleks fistelsystem har ofte behov for langvarig behandling.

Akut svær colitis ulcerosa

Ved komplet respons efter få døgn fortsættes induktionsbehandlingen, som kan efterfølges af vedligeholdelsesbehandling efter en individuel vurdering. Behandling med 5-ASA og immunosupressiva (azathioprin, 6-mercaptopurin) fortsættes eller initieres. Ved partiel/manglende respons bør patienten anbefales operation.

Effekten af vedligeholdelsesbehandling bør vurderes (klinisk/biokemisk) hver 26./52. uge. Ved fortsat tegn på sygdomsaktivitet bør patienten tilbydes operation.

Hvis sygdommen er i remission, kan den biologiske behandling ophøre og der genmonitoreres efter 8-12 uger. Ved fortsat inaktiv sygdom fortsætter patienten uden biologisk behandling.

Ved recidiv efter ophør af vedligeholdelsesbehandling kan behandlingen genoptages eller kirurgi overvejes.

Kronisk aktiv colitis ulcerosa

Vedligeholdelsesbehandling med vurdering af behandlingseffekt minimum hver 26./52. uge (på baggrund af klinisk tilstand, klinisk indeks, biokemiske markører).

Hvis sygdommen er i remission, kan den biologiske behandling ophøre og der genmonitoreres efter 8-12 uger. Ved fortsat inaktiv sygdom fortsætter patienten uden biologisk behandling.

Ved recidiv efter ophør af vedligeholdelsesbehandling kan behandlingen genoptages, eller kirurgi tilbydes.

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalgets sammensætning	Navn:	Udpeget af:
	Professor, overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen	Formand, LVS, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
	Overlæge, dr.med., lektor Lars Kristian Munck	Næstformand, Region Sjælland
	Ledende overlæge, dr.med. Jan Fallingborg	Region Nordjylland
	Specialeansvarlig overlæge, lektor, dr.med. Jens Frederik Dahlerup	Region Midtjylland
	Professor, dr.med., overlæge Ove B. Schaffalitzky de Muckadell	Region Syddanmark
	Spec.ansv., overlæge, dr.med., leder af medicinsk sektion Inge Nordgaard-Lassen	Region Hovedstaden
	Farmaceutisk sekretær, cand.pharm Camilla Munk Mikkelsen	Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
	Cand.med., dr.med., professor, overlæge Jesper Hallas	Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
	Overlæge, dr.med. Anders Pærregaard	Inviteret af formanden
	Ledende overlæge, klinisk lektor, dr.med., ph.d. Mark Andrew Ainsworth	Inviteret af formanden

Ændringslog

Version	Dato	Ændring
1.0	2012.05	1. vurdering
2.0	2013.01	2. vurdering
2.1	2013.09	Golimumab registreret, begrænsning fjernet og dosering anført
2.2	2013.10	Lægemiddeldosering til børn og voksne præciseret
2.3	2015.03	Opdatering med inklusion af vedolizumab til luminal CD og kronisk UC
3.0	2016.12	3. vurdering. Vedolizumab i 1. linje i luminal CD og UC. Ustekinumab indplaceret i 3. linje i CD. Adalimumab rykket til 3. linje i UC.
3.1	2017.12	Datoer opdateret